

Le respect strict de l'asepsie en nutrition parentérale à domicile est la base du soin et fait largement appel aux solutions hydro-alcooliques et masques de soins. L'épidémie de SARS-CoV-2 conduit à des tensions et à des ruptures dans les stocks. Nous avons établi une procédure dégradée adaptée à l'état des stocks et à abandonner dès le retour à un approvisionnement suffisant. Les verrous de taurolidine pourront être prescrits en prévention primaire pendant cette période.

Solutions hydro-alcooliques

- Tension sur le stock

Premier lavage des mains (IDEL, parent, patient en auto-soins) (avant préparation du matériel et du patient)

Remplacer les temps de soins des frictions hydro-alcooliques par le lavage antiseptique des mains jusqu'aux coudes au savon antiseptique (**SEPTIVON 1.5 %**, ou **CYTEAL SOL MOUSS FP250ML** pris en charge à 100 % par la sécurité sociale pour les malades en ALD ou **HIBISCRUB 4 % SOL. MOUSS. non remboursé**). Pour la personne qui fait le soin, il est indispensable que les ongles soient régulièrement coupés et de ne porter ni vernis ni bijoux.



SEPTIVON 1,5 % CUTA FL250ML

Substance active :

Digluconate de chlorhexidine à 1,5 % + excipients



CYTEAL SOL MOUSS FP250ML

Substances actives :

**gluconate de chlorhexidine à 0,5 % + chlorocrésol 0,3 % +
hexamidine di-isétionate 0,1 % + agent moussant**





HIBISCRUB 4 % SOL MOUSS Non Remb. Séc. Soc.
(FI/500ml, FI/125ml).

Substances actives :

Digluconate de chlorhexidine à 4 % + excipients

Second lavage des mains (IDEL, parent, patient en auto-soins) (juste avant habillage stérile pour branchement / débranchement)

Il doit faire appel au SHA.

- **Rupture de stock**

Les deux lavages devront être réalisés au Septivon/Cytéal/Hibiscrub). Cela nécessite de retourner à la salle de bain en cas de branchement/débranchement par autrui. Cela nécessite également pour les petits d'être obligatoirement deux pour les soins afin de le surveiller pendant le 2^{ème} temps de la désinfection des mains.

Masques chirurgicaux

- **Tension sur le stock**

Patient

Mettre un linge propre sur le nez et la bouche et lui faire tourner la tête du côté opposé au cathéter

IDEL, parent, patient en auto-soins

Utiliser le même masque deux fois (pour les patients branchés tous les jours) : au débranchement d'abord et le garder pour le branchement du soir

N.B. : La demande de prescription de masques au médecin traitant permettra peut-être d'obtenir plus de masques qu'en passant par le CLNPAD.

- **Rupture de stock**

Patient

Mettre un linge propre sur le nez et la bouche et lui faire tourner la tête du côté opposé au cathéter

IDEL, parent, patient en auto-soins

Proposer la « réalisation » de masques en utilisant par exemple des petits champs de soins imperméables non stériles (si possible, ou récupérer les champs des sets non utilisés) de petites dimensions (les plus petits possibles, 35 x 45 cm...) à faire tenir bien haut sur le nez avec sparadrap, découpes, élastiques, pince à linge ou avec un morceau de filet tubulaire (Tubifast) : découper un segment (de 30 cm environ) appliquer 2 compresses dépliées superposées sur votre bouche et votre nez sous le Tubifast

N.B. : le Tubifast peut être réutilisé en changeant les compresses avant chaque soin.



Enfin, on pourra utiliser des bandeaux de type buff / foulard / bandana et réaliser des masques de fortune (<https://tinyurl.com/rp9e3mq>).

