

Modalité Pratique d'un retour à Domicile avec une Nutrition parentérale

*Baekeland Joël
IDE coordinateur Centre de NPAD
CHRU de Lille*



**Centre Hospitalier Régional
Universitaire de Lille**

Rôle de l'infirmier du centre de NPAD de Lille :

- ❑ Nutrition parentérale à domicile
- ❑ Travail en collaboration avec le service de nutrition
- ❑ Visite en chambre.
- ❑ Explications prise en charge à domicile.
- ❑ Éducation pendant hospitalisation :
 - ❑ Si le patient souhaite se brancher seul éducation à l'auto-soins
 - ❑ Sinon éducation au protocole de soin

Le patient

- ❑ En premier lieu il faut l'informer sur la NPAD ses intérêts et surtout les risques
- ❑ Demander si il est d'accord pour un retour à domicile
- ❑ Voir avec le patient la voie d'abord susceptible de mieux lui correspondre
- ❑ S'assurer des conditions de vie et de leurs compatibilités avec un retour à domicile
- ❑ Apprendre au patient à détecter les complications liées à la parentérale

Organisation du retour à domicile

Poche Industrielle

- Contact avec prestataire (pompe, pied à perfusion)
(nouvelle réglementation sur nutrition parentérale à domicile applicable depuis le 1 septembre 2014)
- Conception set domicile en collaboration avec le prestataire et dans le respect de la réglementation et du protocole du service.
- Contact IDE libérale ou HAD (explication prise en charge)
- Éducation à l'auto-branchement en hospitalisation pour les patients souhaitant réaliser leurs soins

Organisation du retour à domicile

Poche à Façon

- ❑ Contact avec prestataire (pompe, pied à perfusion et réfrigérateur pour poches à façon)(nouvelle réglementation sur nutrition parentérale à domicile applicable au 1 septembre 2014)
- ❑ Conception set domicile en collaboration avec le prestataire et dans le respect de la réglementation et du protocole du service.
- ❑ Contact IDE libérale ou HAD (explication prise en charge)
- ❑ Éducation à l'auto-branchement en hospitalisation pour les patients souhaitant réaliser leurs soins
- ❑ Commande des poches NP selon la formule auprès du façonnier

Matériel nécessaire pour la réalisation d'une NP à domicile

- ❑ Pompe volumétrique fixe ou portative programmable permettant de réaliser des paliers si besoin
- ❑ Tubulure avec filtre adaptée à la nutrition parentérale
- ❑ Kit de branchement débranchement contenant un maximum de matériel stérile afin d'éviter des ouvertures trop nombreuses de matériel en satellite.
- ❑ Surblouse, masques et charlottes et solution hydro-alcoolique.

Le jour de la sortie

- ❑ Livraison au domicile des poches de NP et matériel nécessaire à la pose des perfusions (pharmacie et prestataire)
- ❑ RDV à domicile avec IDE et prestataire (explication pour prise en charge avec bonnes mesures d'hygiène, respect du protocole et fonctionnement de la pompe)
- ❑ Remise des différentes ordonnances notamment suivi biologique régulier

Suivi des patients

- ❑ Bilan biologique régulier afin de permettre une adaptation de la NP (hebdomadaire pour les poches à façon au début puis mensuel)
- ❑ Visite à domicile par les infirmiers des prestataires avec envoi des suivis au prescripteur. (permet d'avoir un reflet de la bonne gestion de la nutrition parentérale à la maison)
- ❑ Assistance téléphonique tous les jours
- ❑ Suivi en consultation médicale à un mois de la sortie et à trois mois
- ❑ Livraison au domicile une fois par semaine des poches de nutrition parentérale à façon.

Prestataire de service à domicile un maillon important dans la prise en charge à domicile

- ☐ Doit avoir des infirmiers conseils pour intervenir au domicile du patient et réaliser le suivi régulier des patients à domicile
- ☐ Une assistance 24h/24 et 7j/7 pour maintenance de la pompe
- ☐ Gérer la coordination entre le prescripteur et le domicile (patient, infirmière, entourage et médecin traitant)
- ☐ Propose un matériel adapté à la réalisation de la nutrition parentérale à domicile

Collaboration avec Infirmière libérale

- ❑ Premier contact par téléphone et chez le patient le jour de la sortie
- ❑ Intervient en première ligne au quotidien auprès du patient
- ❑ Doit nous alerter lorsqu'il y a un problème avec les poches de nutrition, en cas d'hyperthermie ou troubles importants du transit.
- ❑ Respect des règles d'hygiènes et d'asepsie afin d'effectuer le branchement de la nutrition dans des conditions optimales.